



Pourquoi et pour qui donner?

- Certains couples ne peuvent pas avoir d'enfant car:
- la femme est en insuffisance ovarienne prématurée
 - des traitements ont rendu la femme infertile: chimiothérapie, radiothérapie...
 - le couple risque de transmettre une maladie grave à l'enfant

Le don d'ovocytes va aider ces couples à devenir parents.

En France, le don d'ovocytes est encadré par les lois de Bioéthique (2011).
Il est réalisé par des praticiens agréés dans des centres autorisés.

Le don est soumis à trois grands principes

Volontariat: la donneuse et son conjoint signent un **consentement**.

Gratuité: seuls les frais du don sont pris en charge.

Anonymat: donneuses et receveuses ne peuvent connaître leurs identités respectives.

Conditions du don

Vous avez entre 18 et 36 ans.

Vous êtes en bonne santé.

Depuis 2016, même les femmes qui n'ont pas d'enfant peuvent donner.

LES DEUX GRANDES ÉTAPES DU DON D'OVOCYTES

ÉTAPE N°1 La préparation du don

L'INFORMATION

Réalisée lors d'une première consultation, cette étape est indispensable pour aborder toutes les questions, y compris celle de la contraception.

LE CONSENTEMENT

La donneuse doit signer un formulaire de consentement au don, ainsi que l'autre membre du couple, si la donneuse vit en couple.

LE BILAN PRÉALABLE

L'évaluation de l'état de santé de la donneuse comporte l'étude de ses antécédents familiaux et des examens cliniques et biologiques. Ce bilan permet de mieux connaître la fertilité de la donneuse et d'éliminer toute contre-indication au don.

L'entretien avec le psychologue ou le psychiatre de l'équipe médicale est recommandé et pourra être renouvelé à la demande.

L'ENTRETIEN AVEC UN PSYCHOLOGUE OU PSYCHIATRE

Pour la donneuse et éventuellement l'autre membre du couple, cet entretien représente un temps de parole libre et propice à la réflexion sur la démarche du don dans un cadre neutre (ni famille, ni amis) et personnalisé.

ÉTAPE N°2 La stimulation et le prélèvement

LA STIMULATION DES OVAIRES

Elle dure 10 à 12 jours. Elle permet d'aboutir à la maturation de plusieurs ovocytes. Elle est généralement réalisée par la donneuse elle-même ou par une infirmière grâce à des injections sous-cutanées quotidiennes. Le plus souvent, cette phase de stimulation est précédée d'une ou plusieurs injections pour mettre les ovaires au repos.

UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE

Pendant la période de stimulation, 3 à 4 prises de sang et/ou échographies ovariennes permettent d'évaluer la bonne réponse au traitement. La stimulation est ainsi adaptée au fur et à mesure. Cette surveillance permet également de fixer le jour et l'heure de la dernière injection qui achève la maturation des ovocytes.

LE PRÉLÈVEMENT DES OVOCYTES

C'est la dernière étape du don. Il a lieu au cours d'une hospitalisation d'un jour, 35 à 36 heures après la dernière injection. Il s'effectue par voie vaginale sous contrôle échographique et sous analgésie ou anesthésie. La donneuse peut ensuite quitter l'hôpital, à condition d'être accompagnée.



Ovocyte mature



Fécondation in Vitro avec micro-injection

Appariement avec couple le receveur selon:

- les caractères physiques principaux: ethnie, couleurs des yeux et des cheveux
- les sérologies Cytomégalovirus (CMV)
- le groupe sanguin
- les facteurs cumulatifs de risque génétique

QUELQUES CHIFFRES

En France le don d'ovocytes permet la naissance de **200 à 300 enfants / an**.

Chaque année, près de **1800 couples** sont en attente d'un don d'ovocytes, avec un délai d'attente pouvant aller **jusqu'à 4 ans**.

Le nombre de donneuses acceptées ne cesse d'augmenter, mais reste encore insuffisant.

A ce jour, plus de **1000 enfants** sont nés grâce à un don d'ovocytes.

Dont **≈10 enfants/an** au CECOS TOURS.

POUR DONNER : PRENDRE rendez-vous

CECOS TOURS 02 47 47 88 97